

## **Cholelind Oligoplex®**

Gallentherapeutikum (PZN: 1812125)



### **Zusammensetzung:**

100g enthalten:

Belladonna Dil. D 4

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht:  
**\*Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus\***

Hochfieberhafte Entzündungen des Magen-Darm-Kanals, der Harn- und Geschlechtsorgane.\*Krampfbereitschaft der Gallenwege.\*

Berberis Dil. D 2

Erkrankungen der Leber und Gallenblase.\*Gallen- und Nierenstein - Diathese; Cholezystopathie.\*

Carduus marianus Dil. D 2

Leber-Galle-Erkrankungen.\*Gallebildung; Leberstauung.\*

Dioscorea villosa Dil. D 2

Koliken des Magen-Darm-Kanals.\*Hypertonus der Bauchorgane.\*

Leptandra Dil. D 4

Entzündungen der Leber, des Gallensystems.\*Entzündliche Erscheinungen des Leber- und Gallensystems.\*

āā 20,0 g

### **Anwendungsgebiet:**

Unterstützende Behandlung bei Erkrankungen des Gallensystems.  
Hinweis: Bei Gallensteinleiden, Verschluss der Gallenwege oder Gelbsucht sollte ein Arzt aufgesucht werden, ebenso bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.



### **Dosierung:**

1-3x täglich 5 - 10 Tropfen.



### **Hinweis:**

10g (=10,9ml), 1g entspricht 21 Tropfen.



### **Warnhinweis:**

Enthält 59 Vol.-% Alkohol. Anwendung in Schwangerschaft/Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt (keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen). Geben Sie Cholelind Oligoplex® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.

### **Gegenanzeigen:**

Überempfindlichkeit gegen Carduus marianus (Mariendistel) oder andere Korbblütler.

### **Nebenwirkungen:**

Keine bekannt.

### **Wechselwirkungen:**

Keine bekannt.