

Ledum Oligoplex®

Porst, Sumpfporst (PZN: 4451998)



Zusammensetzung:

100g enthalten:

Ledum Dil. D 3

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht:
Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus

Gicht und Gelenkrheumatismus. *Gelenkaffektion bei rheumatischen und gichtigen Erkrankungen.*

Bryonia Dil. D 3

Akuter und chronischer Rheumatismus.*Exsudationsneigung der serösen Häute.*

Colchicum Dil. D 4

Akute und chronische Gicht; Akuter Gelenkrheumatismus.*Reguliert den Harnsäurestoffwechsel.*

Dulcamara Dil. D 3

Entzündungen der Gelenke, ausgelöst durch Kälte und Nässe. *Rheumatisch-neuralgische Beschwerden.*

Gnaphalium polycephalum (HAB 1934)
Dil. D 2 (HAB Vorschrift 3a)

Rheumatismus; Ischiasschmerz; Nervenschmerzen.
Rheumatisch-neuralgische Beschwerden.

Natrium nitricum Dil. D 3

Rheumatismus; Schwächezustände.*Rheumatismus und Gicht, verzögerte Heilung von Haut- und Schleimhautdefekten.*

Rhododendron Dil. D 3

Rheumatismus; Nervenschmerzen. *Wetterfähigkeit des Rheumatikers und Gichtkranken.*

āā 14,3 g

Anwendungsgebiet:

Besserung rheumatischer Beschwerden.



Dosierung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Gegenanzeigen:

Ledum Oligoplex® ist in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei Kindern unter 12 Jahren nicht anzuwenden (Colchicum).

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.



Hinweis:

10g (=11,1ml), 1g entspricht 21 Tropfen.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.



Warnhinweis:

Enthält 63 Vol.-% Alkohol. Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen, sowie andauernden Beschwerden, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Geben Sie Ledum Oligoplex® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.