

## Silicea S Oligoplex®

Kieselsäure (PZN: 3673662)



### Zusammensetzung:

100g enthalten:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Silicea Trit. D 3                   | Chronische Entzündungen, Eiterungen und Fistelbildung der Haut, der Schleimhäute, der Knochen und Gelenke; Gewebsschwäche im Bandapparat der Knochen und Gelenke; Gewebewucherungen.*Zur Aktivierung des Bindegewebes.* |
| Arnica Trit. D 3                    | Blutungen aller Art; Myalgie nach Überlastung; Erkrankungen des arteriellen und venösen Systems.*Furunkulose.*  |
| Calcium fluoratum Trit. D 4         | Degenerative Veränderungen am Stütz- und Bindegewebe.*Bindegewebsschwäche.*   |
| Stibium sulfuratum nigrum Trit. D 4 | Hauterkrankungen.*Haut- und Schleimhautreaktionen bei exsudativer Diathese, chronische Ekzeme, Hyperkeratosen, Rhagaden.*   |
| Thuja Trit. D 3<br>50,0 mg          | Haut- und Schleimhauterkrankungen.*Roborans.*   |

### Anwendungsgebiet:

Zur unterstützenden Behandlung bei Bindegewebsschwäche und bei lokal begrenzten Hautentzündungen.

### Gegenanzeigen:

Silicea S Oligoplex® nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe oder gegen Korbbblütler. Silicea S Oligoplex® nicht anwenden bei Säuglingen und Kleinkindern sowie in Schwangerschaft und Stillzeit.

### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

### Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht:  
\*Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus\*



### Dosierung:

1-3mal täglich 1 Tablette einnehmen.



### Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Silicea S Oligoplex® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden. Geben Sie Silicea S Oligoplex® Kindern von 6 bis 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.