

Ferrum Oligoplex®

Metallisches Eisen (PZN: 6196010)



Zusammensetzung:

100g enthalten:

Ferrum metallicum Trit. D 3

Aloe Trit. D 3

Cuprum Trit. D 6

Platinum chloratum Trit. D 6

Urtica (HAB 1934) Trit. D 2
(HAB Vorschrift 2a;7)

āā 50,0 mg

Anwendungsgebiet:

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Hinweis: Bei während der Anwendung fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

Gegenanzeigen:

Keine bekannt.

Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Die Aufbereitungskommission D hat in ihren Monographien für die Einzelbestandteile die folgenden Hauptindikationen im Bundesanzeiger veröffentlicht:
Arzneimittelbilder nach Magdalene Madaus

Blutungen; Blutarmut.*Sekundäre Anämie.*

Magen-Darm-Störungen; Stuhlinkontinenz;

Hämorrhoiden.*Verdauungsstörungen bei sekundärer Anämie.*

Cerebrales Anfallsleiden; Muskelkrämpfe; Krämpfe der glatten Muskulatur, des Magen-Darm-Kanals, der Atemorgane, der Gefäße, der Herzkranzgefäße. Kreislaufversagen.*Zur Anregung der Blutbildung.*

Hinterkopfschmerz.*Roborans.*

Nesselsuchtartige Hauterkrankungen, Nierenleiden, Gicht.

Blutreinigung, Blut bildend.



Dosierung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6mal täglich je 1 Tablette vor den Mahlzeiten im Mund zergehen lassen. Die Einnahme sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 1 Woche erfolgen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.



Warnhinweis:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Ferrum Oligoplex® daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Ferrum Oligoplex® in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden. Geben Sie Ferrum Oligoplex® Kindern unter 12 Jahren nur nach Rücksprache mit dem Arzt, da bisher keine ausreichenden Erfahrungen für eine allgemeine Empfehlung für diese Altersgruppe vorliegen.